

Principio Activo	Técnica analítica para farmacias	Efecto terapéutico
ACETILCISTEINA	Punto de fusión 104 a 110°C	Mucolítico. Vía tópica ictiosis lamelar. Vía oftálmica queratoconjuntivitis, tópica y oral
ACICLOVIR	Punto fusión 257°C	Antivírico. Tópica y oral
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Punto de fusión 135-144°C	Analgesico, anticoagulante a dosis de 100 a 300mg/día
ÁCIDO RETINOICO	Punto de fusión 180-182°C	Acelera reproducción celular. Vía tópica
ÁCIDO RETINOICO 13 CIS	Punto de fusión 175°C	Antiacné, sebo regulador. Vía oral
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO	Punto de fusión 202°C	Colerético y colagogo, tratamiento obstrucción vesícula biliar. Cirrosis biliar primaria.
BECLOMETASONA DIPROPIONATO	Punto de fusión 210°C	Corticoide vía tópica
BETAMETASONA DIPROPIONATO	Punto de fusión 170-179°C	Corticoide vía tópica
BETAMETASONA VALERATO	Punto de fusión 192°C	Corticoide vía tópica
CARVEDILOL	Punto de fusión 113-117°C	Vasodilatador, tratamiento insuficiencia cardíaca. Vía oral
CICLOSPORINA	Punto de fusión 148-151°C	Inmunosupresor, vía oral, vía oftálmica ojo seco
CLOBETASOL PROPIONATO	Punto de fusión 195-197°C	Corticoide vía tópica
CLORANFENICOL	Punto de fusión 149-153°C	Antibiótico uso externo, vía oftálmica
CLORPROMAZINA CLH	Punto de fusión 194-198°C	Antipsicótico vía oral, evita náuseas y vómitos, eyaculación precoz vía sublingual
CLOTRIMAZOL	Punto de fusión 141-145°C	Antifúngico vía tópica
DEXAMETASONA BASE	Punto de fusión 262-264°C	Corticoide vía tópica
DHEA (PRASTERONA)	Punto de fusión 146-151°C	Prehormona sexual
DIAMINOPIRIDINA 3,4	Punto de fusión 143-148°C	Antibiótico
DILTIAZEM CLH	Punto de fusión 183-185°C	Vasoconstrictor vía tópica. Fisuras rectales
DIPIRIDAMOL 25g	Punto de fusión 163-165°C	Anticoagulante vía oral
ENROFLOXACINO	Punto de fusión 219 -221°C	Antibiótico
EPINEFRINA TARTRATO	Punto de fusión 155°C	Shock alérgico, asma bronquial, rescate cardíaco
ERITROMICINA	Punto de fusión 193°C	Antibiótico tópico, tratamiento acné
ESPIRONOLACTONA	Polvo blanco o ligeramente amarillento con olor característico	Diurético vía oral. Tratamiento alopecia vía tópica y oral

ESTRADIOL 17 ALFA	Punto de fusión 220-223°C	Hormona esteroide vía tópica tratamiento alopecia
ESTRADIOL 17 BETA	Punto de fusión 173°C	Hormona sexual femenina vía tópica transdérmica
ESTRADIOL VALERATO	Punto de fusión 144°C	Hormona sexual femenina vía oral
FINASTERIDA	Punto de fusión 252 - 254°C	Tratamiento de HBP, tratamiento alopecia vía oral y tópica
FLUOCINOLONA ACETONIDO	Punto de fusión 265-266°C	Corticoide tópico
FLUOROURACILO-5	Punto de fusión 282-283°C (descomposición)	Queratosis actínica y los cánceres de piel superficiales de células basales y escamosas
HIDROCORTISONA ACETATO	Punto de fusión 221-224°C	Corticoide oral y tópico
HIDROCORTISONA BASE	Punto de fusión 214°C	Corticoide oral y tópico
HIDROQUINONA	Punto de fusión 172°C	Despigmentante
KETOCONAZOL	Punto de fusión 148-152°C	Antifúngico
LIDOCAÍNA BASE	Punto de fusión 66-69°C	Anestésico tópico piel
LIDOCAÍNA CLH	Punto de fusión 74-79°C	Anestésico tópico mucosas
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO	Punto de fusión 205-209°C	Hormona vía oral
METILPREDNISOLONA	Punto de fusión 233°C	Corticoide vía oral y tópica
METRONIDAZOL	Punto de fusión 159 a 163°C	Antibiótico y antiparasitario
MICONAZOL NITRATO	Punto de fusión 178-184°C	Antifúngico
MINOXIDIL	Punto de fusión 248-265°C	Vasodilatador, crece pelo vía oral y tópica
NISTATINA	Polvo amarillo parduzco, insoluble en agua, olor acre característico	Antifúngico, vía oral y tópico
OMEPRAZOL	Punto de fusión de 150 - 160°C	Tto. úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico
ORLISTAT	Punto de fusión 43°C	Inhibe absorción intestinal grasas. Pérdida de peso.
PILOCARPINA CLH	Punto de fusión 199-205°C	Sequedad de boca por radioterapia o síndrome de sjongren
PREDNISOLONA	Punto de fusión 230-235°C	Corticoide tópico
PRILOCAÍNA BASE	Punto de fusión 36-38°C	Anestésico tópico
PROGESTERONA MICRONIZADA	Punto de fusión: 127-133 °C (forma alfa), 121°C (forma beta)	Hormona femenina vía tópica transdermal
RANITIDINA CLH	Punto de fusión 133-134°C	Tto. de úlcera duodenal y reflujo gastroesofágico
SALBUTAMOL SULFATO	Aceptar ensayo del proveedor. Polvo blanco o casi blanco	Tto. de enfermedades pulmonares obstructivas

SILDENAFILO CITRATO	Punto de fusión 182-196°C	Impotencia sexual masculina, hipertensión pulmonar primaria
SODIO CROMOGLICATO	Punto de fusión 241-241 con descomposición	Tratamiento del asma y mastocitosis. Vía tópica y oral
SUCRALFATO	Gelifica en soluciones acidas inferiores a 4. polvo blanco amorfo	Tratamiento de úlceras gastroduodenales, reflujo y úlceras de estrés
TACROLIMUS	Punto de fusión 127-133°C	Inmunosupresor. Tratamiento ojo seco. Vía tópica y oral
TESTOSTERONA BASE	Punto de fusión 153-157°C	Hormona masculina. Vía tópica transdermal
TESTOSTERONA PROPIONATO	Punto de fusión 119- 123°C	Hormona masculina. Vía tópica y vía oral
TETRACAINA CLH	Punto de fusión 148-149°C	Anestésico tópico
TRIAMCINOLONA ACETONIDO	Punto de fusión 292-294°C	Corticoide tópico
TRILOSTANO	Punto de fusión 258-270°C	Tto. de cushind e hiperaldoteronomismo primario
VANCOMICINA CLH	pH solución 1% entre 2,5 y 4,5. aceptar ensayo proveedor	antibiótico
VERAPAMILO CLH	Punto de fusión 183-185°C	Tto. de la Peyronie
(*) Contactar con Laboratorios GUINAMA para cualquier duda o más información		



GUINAMA, S.L.U. C/ Praga s/n Pol. Ind. Gutenberg
 La Pobla de Vallbona 46185 (Valencia) España.
 Tel. +34 961 869 090 - Fax. +34 961 850 352
www.guinama.com