

Colodión antiverrugas			Cantidad a elaborar: 30 ml	
Producto:	Cantidad	Total	N° de lote	
Fase I	Ácido láctico	15%	4.50 g	
	Ácido salicílico	15%	4.50 g	
	Colodión elástico	csp	csp	
Envase	Frasco vidrio topacio 30 mL	1 ud	1 ud	

### MODUS OPERANDI

Orden	Procedimiento:
1	En un mortero pulverizar finamente el ácido salicílico e incorporarlo al envase final.
2	Añadir el ácido láctico al envase final y con el ácido salicílico y agitar con ayuda de una varilla hasta homogeneidad.
3	Se añade el colodión elástico en cantidad suficiente hasta alcanzar el volumen deseado.
4	Se cierra y se agita enérgicamente hasta la disolución de los activos. Etiquetar.

**Elementos de seguridad personal:** Guantes, mascarilla, bata

**Utillaje utilizado:** Balanza, Espátula, varilla de vidrio.

#### CONTROL DE CALIDAD:

La RFE describe los controles de calidad para esta crema: Características organolépticas.

Características del producto acabado: Líquido transparente viscoso de cierto color amarillento.

Aspecto final: Líquido transparente viscoso de cierto color amarillento sin partículas en suspensión.

RESULTADOS

PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

### INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

#### INDICACIONES Y POSOLOGIA

Tratamiento de verrugas de cualquier localización excepto la genital y la facial. Puede utilizarse como terapia única o complementaria al tratamiento cáustico con ácido nítrico, fenol, tricloroacético, etc, realizado en la consulta facultativa.

Exclusivamente por vía tópica. Aplicar cada 24 horas realizando cura oclusiva impermeable, a fin de macerar la lesión para aumentar el efecto terapéutico del preparado. Antes de realizar una nueva aplicación, eliminar



mediante raspado el tejido hiperqueratósico destruido.

#### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Decapado previo de la verruga con eliminación del máximo tejido hiperqueratósico posible.

Protección del tejido circundante a la zona a tratar con vaselina a fin de evitar posibles quemaduras

Aplicación directa cada 24 h del preparado sobre la lesión o según pauta facultativa

Cubrir la lesión con apósito oclusivo no transpirable o seguir pauta facultativa.

La duración del tratamiento dependerá de la evolución de la lesión y del criterio del facultativo.

Evitar el contacto del producto con mucosas o piel no afectada.

Guardar en lugar seco y fresco, protegido de la luz.

#### CONSERVACIÓN

En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 90 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, a temperatura inferior a 25°C y alejado de los focos de ignición.

#### REACCIONES ADVERSAS

Puede presentar irritación cutánea en tratamientos prolongados y ligeras quemaduras en zonas circundantes a la de su aplicación si éstas no son protegidas previamente a la aplicación.

En caso de aparecer reacciones alérgicas suspender el tratamiento y consultar al facultativo.

#### PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No aplicar sobre heridas y mucosas

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del preparado. Ha de realizarse un control especial en ancianos, niños, enfermos diabéticos o de cualquier otro tipo en el que pueda conllevar riesgo el tratamiento cáustico establecido.

#### OBSERVACIONES

Comprobar que la disolución es completa.

#### BIBLIOGRAFIA:

1. Monografías del COF de Alicante
2. Asociación de Formulistas de Andalucía
3. Información del fabricante

